



Améliorer la pertinence des soins en gérontologie

Résultats de la campagne 2024 en Nouvelle-Aquitaine

Benjamin Festou, Clément Lahaye, Thomas Gilbert, Dominique Somme, Emilie Menand, Jean-Baptiste Beuscart, Guillaume Deschasses, Manuel Sanchez, Florent Guerville, Yves Passadori, Cédric Villain, Evelyne Liuu, Anne-Sophie Boureau, Nolwen Oiry, Mathilde Guyot, Nathalie Jomard, Saskia Foucart-Caron, Elise Renard, **Aline Corvol**

Les 5 recommandations 2024

- **Items consensuels**
- **Problèmes de non-pertinence fréquents**
- **Pratiques susceptibles d'évoluer par un simple rappel (campagne d'EPP)**

1 - « Antipsychotiques »



2 - « Benzodiazépines »



3 - « Inhibiteurs de la pompe à proton »



4 - « Bandelettes urinaires et ECBU »



5 - « Décision partagée »



Reco 4 : BU/ECBU



**« En l'absence de symptômes cliniques urinaires,
il n'y a d'indication ni à une analyse d'urine
ni à un traitement antibiotique »**

Sources des données

Patients



795

Nb moyen de dossier par établissement

57

Etablissements



14

Services

24

Age moyen



87 ans

Réponses par secteur

MCO

347
44%


SMR


120
15%


EHPAD
USLD

328
41%

Grille évaluation







Les indicateurs (Nouvelle Aquitaine)

→ Taux de patients avec BU ou ECBU non pertinents

34,8 %
(78 / 224)


MCO	33,1 %	(52/157)
SMR	42,6 %	(20/47)
EHPAD - USLD	30 %	(6/20)

→ Taux de patients avec ATB prescrit alors que BU ou ECBU non pertinents

14,1 %
(11 / 78)

MCO	1,9 %	(1/52)
SMR	25 %	(5/20)
EHPAD - USLD	83,3 %	(5/6)

Distribution des indicateurs par établissement



Antipsychotiques

- Algorithme déprescription
- Recos si récidives troubles
- Recos prise en soins des SPC

Inhibiteurs de la pompe à proton

- IPP-outil déprescription
- Fiche patient - arrêt IPP

Benzodiazépines

- Algorithme anxiété
- Algorithme insomnie plainte chronique
- Algorithme insomnie plainte récente
- Info patient OMEDIT
- Brochure patient EMPOWER
- Vidéo

Analyse d'urine

- Affiche bureau médical
- Affiche poste de soins
- Support de formation

Décision partagée

- Brochure « Faire dire »
- Affiche « Oser parler à son médecin»
- Jeu « A vos souhaits »
- Vidéo personne de confiance

Choisir avec soin
**Boite
à outils**

Affiche pour les postes de soins

A afficher dans le poste de soins et/ou à proximité du lecteur de BU



Pertinence des soins en gériatrie



ANALYSE D'URINE (BU/ECBU)

En l'absence de symptômes cliniques urinaires, il n'y a d'indication ni à une analyse d'urine ni à un traitement antibiotique



Cette analyse d'urine est-elle VRAIMENT utile ?

Pensez bien à rechercher un de ces symptômes urinaires :

- Mictions impérieuses, fréquentes ou douloureuses
- Brûlures mictionnelles
- Douleur sus-pubienne
- Apparition ou aggravation d'une incontinence urinaire

**« Pas d'infection, pas de symptômes.
Pas de symptômes, pas de BU.
Pas de BU... pas de BU. »**

